



一 予防接種を受ける前の注意一

- ① 町が配布した「予防接種と子どもの健康」をお読みにになり、十分理解したうえで受けてください。
 - ② 乳幼児期の予防接種は個人通知をしませんので、計画的に受けてください。
 - ③ **母子手帳を必ずご持参ください。**（忘れた場合は受けられません。）
 - ④ **対象年齢を過ぎてしまうと、任意の予防接種となり、自己責任・自己負担での接種となります。**
 - ⑤ なるべく、「標準的な接種」の受け方で受けるようにしてください。
 - ⑥ 予防接種の受け方についてわからない場合は、役場 保健師（TEL46-1200）までお尋ねください。
- ※場所…**県内の各医療機関（一部を除く）** また、なるべく本人の状況等を把握したかかりつけ医等で接種してください。
- ※期間…**年間を通して受けることができます。必ず予約をして下さい。**

● 接種スケジュール ●

種類	対象年齢		回数	時期・間隔	標準的な接種
ヒブ	生後2～60か月に至るまで	開始年齢が生後2～7か月に至るまでの間	初回3回 追加1回	【初回】生後12か月に至るまでの間に、27日以上あける 【追加】初回接種終了後7か月以上あける ※生後12か月までに3回の初回接種を終了せずに生後12か月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日以上の間隔をおいて1回	【初回】生後2～7か月に至るまでに開始 【追加】初回接種終了後7～13か月までの間隔をおく
		開始年齢が生後7～12か月に至るまでの間	初回2回 追加1回	【初回】生後12か月に至るまでの間に、27日以上あける 【追加】初回接種終了後7か月以上あける ※生後、12か月までに2回の初回接種を終了せずに生後12か月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日以上の間隔をおいて1回	
		開始年齢が生後12～60か月に至るまでの間	1回	—	
小児用肺炎球菌	生後2～60か月に至るまで	開始年齢が生後2～7か月に至るまでの間	初回3回 追加1回	【初回】生後24か月に至るまでの間に、27日以上あける ※ただし、初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合、初回3回目の接種は行わない。 【追加】初回終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月に至った日以降	【初回】生後2～7か月に至るまでに開始 【追加】初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12～15か月に至るまで
		開始年齢が生後7～12か月に至るまでの間	初回2回 追加1回	【初回】生後24か月に至るまでの間に、27日以上あける 【追加】初回終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月に至った日以降	
		開始年齢が生後12～24か月に至るまでの間	2回	60日以上あける	
		開始年齢が生後24～60か月に至るまでの間	1回	—	
B型肝炎 ^{※1}	1歳に至るまでの間		初回2回	【初回】27日以上あける	生後2か月に至った時から生後9か月に至るまで
			追加1回	【追加】1回目の接種から139日以上あける	

※1 B型肝炎はH28.10.1～定期接種になりました。

種類	対象年齢	回数	時期・間隔	標準的な接種	
四種混合 (ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ)	生後3～90か月に至るまでの間	1期初回 3回	20日以上あける	生後3か月に達した時から 12か月に達するまでの間 (20～56日までの間隔をおく)	
		1期追加 1回	1期初回接種(3回)終了後6 か月以上あける	1期初回接種(3回)終了後 12～18か月の間隔をおく	
BCG(結核)	1歳に至るまでの間	1回	—	生後5か月に達した時から 8か月に達するまでの間	
水痘	生後12～36か月に至るまでの間	2回	—	【1回目】生後12～15か月に 達するまで	
			3か月以上あける	【2回目】1回目接種終了後6か 月～12か月までの間隔をおく	
麻しん風 しん混合	生後12～24か月に至るまでの間	1期1回	—		
	小学校就学前の1年間	2期1回			
日本脳炎	生後6～90か月に至るまで	1期初回 2回	6日以上あける	3～4歳に達するまでの間 (6～28日までの間隔をおく)	
		1期追加 1回	1期初回終了後6か月以上あける	4～5歳に達するまでの間 (1期初回終了後、おおむね1年 の間隔をおく)	
	9歳以上13歳未満	2期1回	—	9～10歳に達するまでの間	
二種混合 (ジフテリア 破傷風)	11歳以上13歳未満	1回	—	11～12歳に達するまでの間	
子宮頸がん	サーバリックス 12歳となる日の属する年度の 初日から16歳となる日の属す る年度の末日までの間にある女 子 ※現在、積極的な接種の呼びか けを差し控えています。接種に あたっては、有効性とリスクを 理解した上で受けてください。	3回	【2回目】 1回目から1か月以上あける 【3回目】 1回目の接種から5か月以上、 かつ2回目の接種から2か月 半以上あける	13歳とな る日の属す る年度の初 日から当該 年度の末日 までの間	【2回目】 1回目の接種から 1か月あける 【3回目】 1回目の接種から 6か月あける
	ガーダシル サーバリックスとガーダシル2 つのワクチンを混合して接種す ることはできません。同一のワ クチンを3回続けて接種するよ うにしてください。		【2回目】 1回目の接種から1か月以上 あける 【3回目】 2回目の接種から3か月以上 あける		【2回目】 1回目の接種から 2か月あける 【3回目】 1回目の接種から 6か月あける

●他の予防接種との間隔●

6日以上あけるもの	ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、二種混合、日本脳炎、子宮頸がん、三種混合、不活化ポリオ、B型肝炎
27日以上あけるもの	BCG、麻しん風しん混合、水痘

日本脳炎の予防接種については、積極的な接種の呼びかけを差し控えていた期間(平成17年～21年)がありました。そのため、日本脳炎の予防接種対象者の拡大及び接種期間が延長されています。

- 平成7年4月2日～平成19年4月1日生で未接種の方は、未完了分から接種できます。(接種期間20歳未満)
- 平成19年4月2日～平成21年10月1日生で1期の予防接種が終了していない方は、9歳以上13歳未満の間で、未完了分から接種できます。

・乳幼児期の接種歴により接種間隔が異なります。母子健康手帳で確認し、役場 健康推進係までお尋ねください。