



**一 予防接種を受ける前の注意**

- ① 町が配布した「予防接種と子どもの健康」をお読みにになり、十分理解したうえで受けてください。
- ② 乳幼児期の予防接種は個人通知をしませんので、計画的に受けてください。
- ③ 母子手帳を必ずご持参ください。（忘れた場合は受けられません。）
- ④ 対象年齢を過ぎてしまうと、任意の予防接種となり、自己責任・自己負担での接種となります。
- ⑤ なるべく、「標準的な接種」の受け方で受けるようにしてください。
- ⑥ 予防接種の受け方についてわからない場合は、役場 保健師（Tel46-1200）までお尋ねください。

※場所…**県内の各医療機関（一部を除く）**

※期間…**年間を通して受けることができます。必ず予約して下さい。**

**●接種スケジュール●**

種類	対象年齢		回数	時期・間隔	標準的な接種
ヒブ	生後2～60か月に至るまで	開始年齢が生後2～7か月に至るまで	初回3回 追加1回	【初回】生後12か月に至るまでの間に、27日以上あける 【追加】初回接種終了後7か月以上あける ※生後、12か月までに3回の初回接種を終了せずに生後12か月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日以上の間隔をおいて1回	【初回】生後2～7か月に至るまでに開始 【追加】初回接種終了後7～13か月まで
		開始年齢が生後7～12か月に至るまで	初回2回 追加1回	【初回】生後12か月に至るまでの間に、27日以上あける 【追加】初回接種終了後7か月以上あける ※生後、12か月までに2回の初回接種を終了せずに生後12か月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日以上の間隔をおいて1回	
		開始年齢が生後12～60か月に至るまで	1回	—	
小児用肺炎球菌	生後2～60か月に至るまで	開始年齢が生後2～7か月に至るまで	初回3回 追加1回	【初回】生後24か月に至るまでの間に、27日以上あける ※ただし、初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合、初回3回目の接種は行わない。 【追加】初回終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月に至った日以降	【初回】生後2～7か月に至るまでに開始 【追加】生後12～15か月に至るまで
		開始年齢が生後7～12か月に至るまで	初回2回 追加1回	【初回】生後24か月に至るまでの間に、27日以上あける 【追加】初回終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月に至った日以降	
		開始年齢が生後12～24か月に至るまで	2回	60日以上あける	
		開始年齢が生後24～60か月に至るまで	1回	—	
※B型肝炎	生後1歳に至るまで		3回	【2回目】1回目の接種から27日以上の間隔をおく 【3回目】1回目の接種から139日以上の間隔をおく	生後2か月に至った時から生後9か月に至るまで
四種混合 ジフテリア 百日咳 ポリオ 破傷風	生後3～90か月に至るまで		1期初回 3回	20日以上あける	生後3か月に達した時から12か月に達するまでの間（20～56日までの間隔） 1期初回接種（3回）終了後12～18か月の間
			1期追加 1回	1期初回接種（3回）終了後6か月以上あける	

※B型肝炎はH28.10.1～定期接種になりました。

種類	対象年齢	回数	時期・間隔	標準的な接種	
BCG	生後1歳に至るまで	1回	—	生後5か月に達した時から8か月に達するまでの間	
水痘	生後12～36か月に至るまで	2回	3か月以上あける	【1回目】生後12～15か月に達するまで 【2回目】1回目接種終了後6か月～12か月までの間隔をおく	
			—		
麻しん風しん混合	生後12～24か月に至るまで	1期1回	—		
	小学校就学前の1年間	2期1回			
日本脳炎	生後6～90か月に至るまで	1期初回 2回	6日以上あける	3～4歳までの間 (6～28日までの間隔)	
		1期追加 1回	1期初回終了後6か月以上あける	4～5歳までの間 1期初回終了後、おおむね1年の間隔をおく	
	9歳以上13歳未満	2期1回	—	9～10歳までの間	
二種混合 〔ジフテリア〕 破傷風	11歳以上13歳未満	1回	—	11～12歳までの間	
子宮頸がん	サーバリックス	3回	【2回目】 1回目から1か月以上あける 【3回目】 1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上あける	13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間	【2回目】 1回目の接種から1か月あける 【3回目】 1回目の接種から6か月あける
	ガーダシル		【2回目】 1回目の接種から1か月以上あける 【3回目】 2回目の接種から3か月以上あける		【2回目】 1回目の接種から2か月あける 【3回目】 1回目の接種から6か月あける

●次の予防接種との間隔●

6日以上あけるもの	ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、二種混合、日本脳炎、子宮頸がん、三種混合、不活化ポリオ、B型肝炎
27日以上あけるもの	BCG、麻しん風しん混合、水痘